多フレーバー格子ゲージ理論からの 高温高密度QCD相転移の研究

江尻信司(新潟大学)

共同研究者: 山田憲和(KEK)

熱場の量子論とその応用、理研、2014/9/3-5

QCD相転移のクォーク質量依存性

- クォーク質量をパラメーターと思うと面白い相構造を持っている。
- 有限密度で物理的な質量点が臨界面を横切るところが、クロスオーバーが一次相転移に変わる臨界点。
- 一次相転移は非常に質量が小さい領域にあるので、研究が難しい。

クォークが重い領域での一次相転移でなくなる臨界面

WHOT-QCD Collab., Phys.Rev.D84, 054502(2011); Phys.Rev.D89, 034507 (2014)

- Quenched simulations + Reweighting for dynamical fermions.
- Standard Wilson quark action + plaquette gauge action, $S_g = -6N_{\text{site}}\beta P$
- $24^3 \times 4$ lattice

Hopping parameter expansion

$$\kappa \sim 1/(\text{quark mass})$$

$$N_f \ln \left(\frac{\det M(\kappa, \mu)}{\det M(0,0)} \right) = N_f \left(288 N_{\text{site}} \kappa^4 P + 12 \cdot 2^{N_t} N_s^3 \kappa^{N_t} (\cosh(\mu/T) \Omega_R + \underline{\underline{i \sinh(\mu/T) \Omega_I}}) + \dots \right)$$

phase $\sim O(\kappa^{N_t})$

P : plaquette, $\Omega = \Omega_R + i\Omega_I$: Polyakov loop

$\det M(0,0) = 1$ 3

(2+1)-flavor QCD のクォークが重い領域での 一次相転移でなくなる臨界面

$\kappa=0$: $Z(3)$ 対称な分布

有限密度での臨界面

$$2\kappa_{ud\text{cp}}^{N_t} \cosh(\mu_{ud}/T) + \kappa_{s\text{cp}}^{N_t} \cosh(\mu_s/T) \approx 4 \times 10^{-5}$$

$(N_t = 4)$

κ 小: 二相共存
(一次相転移)

臨界点付近の κ :
山が1つになる

$\kappa \sim 1/(\text{quark mass})$

$2+N_f$ -flavor QCD

- 軽い2種類のクォークと重い N_f 種類のクォークのある系

多フレーバー・テクニカラーモデルと電弱相転移

(Kikukawa, Kohda and Yasuda, Phys.Rev.D77, 015014(2008))

- 多フレーバーQCDによるテクニカラーモデルの構築
- QCDのカイラル対称性の破れ
  - 有限温度電弱相転移
- 南部・ゴールドストーン(NG)・ボゾン
  - ゲージボゾンに吸われる3つ必要。
  - 他のNGボゾンは観測されていない。(重い。)
  - 2つのテクニ・フェルミオンは質量0、他のフェルミオンは重い。
- 電弱バリオジェネシス
  - 強い1次相転移が必要。(標準モデルでは1次相転移にならない。)
  - 2+1-フレーバーQCDの類推: フェルミオンが重くなると1次相転移でなくなる。
- 多フレーバーQCDで1次相転移の終点を求めることが重要。

(2+Nf)-flavor QCDの相構造

Ejiri, Yamada, Phys. Rev. Lett. 110,172001 (2013)

動的フェルミオン: 軽いフレーバー2つと、重いフレーバー N_f 個

N_f -フレーバーが重い場合、
 N_f が増加するにしたがって、
臨界質量は大きくなる。

計算が簡単になる。

三重臨界スケーリング則は
(2+1)-flavor QCDと同じ。

$$m_{ud}^c \sim (m_E - m_h)^{5/2}$$

$$m_{ud}^c \sim \mu^5$$

Tricritical point: m_E

2+1-flavor QCDを理解するための絶好の練習台

2-flavor QCDのカイラル極限は 2次相転移か1次相転移か？

- 三重臨界点は本当にあるのか？
- 2-flavor QCDに一次相転移の領域があるか？

or

ヒストグラム法、分布関数と有効ポテンシャル

(S. Ejiri, Phys. Rev. D 77 (2008) 014508)

$$W(X; m, T, \mu) \equiv \int DU \delta(X - \hat{X}) \prod_{f=1}^{N_f} \det M(m_f, \mu_f) e^{-S_g} \quad (\text{Histogram})$$

X: 秩序パラメーター、クォーク数、作用、プラケット、など

$$V_{\text{eff}}(X) = -\ln W(X)$$

クロスオーバー

W(X): ガウス関数
V(X): 2次関数

臨界点

W(X): 頂上が平
V(X): 曲率ゼロ

一次相転移

プラケットの確率分布関数(ヒストグラム)

一次相転移: 位相共存状態

$$W(P, \beta, m, \mu) \equiv \int DU \delta(\hat{P} - P) \prod_{f=1}^{N_f} \det M(m_f, \mu_f) e^{6N_{\text{site}} \beta \hat{P}} \quad \left(\beta = 6/g^2 \right)$$
$$S_g = -6N_{\text{site}} \beta P$$

plaquette P (1x1 Wilson loop for the standard action)

$$R(P, \beta, \beta_0 m, m_0, \mu) \equiv W(P, \beta, m, \mu) / W(P, \beta_0, m_0, 0) \quad \text{(Reweight factor)}$$

$$R(P) = \frac{\left\langle \delta(\hat{P} - P) e^{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{(\beta_0, \mu=0)}}{\left\langle \delta(\hat{P} - P) \right\rangle_{(\beta_0, \mu=0)}} \equiv \left\langle e^{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{P:\text{fixed}}$$

有効ポテンシャル:

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, m, \mu) = -\ln[W(P, \beta, m, \mu)] = V_{\text{eff}}(P, \beta_0, m_0, 0) - \ln R(P, \beta, \beta_0 m, m_0, \mu)$$

$$\ln R(P) = \underline{6N_{\text{site}}(\beta - \beta_0)P} + \ln \left\langle \underline{\prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)}} \right\rangle_{P:\text{fixed}}$$

一次相転移点: 二相共存状態

プラケットの確率分布関数

- 2-flavor QCDのシミュレーションを行い、
- Reweightingで Nf-flavor の動的クォークの効果を取り入れる。
- Nf個のクォークは重いと仮定する。
- ホッピングパラメータ κ 展開 (Wilson quarkの場合)

$$N_f \ln \left(\frac{\det M(K, \mu)}{\det M(0, 0)} \right) = N_f \left(288 N_{\text{site}} K^4 P + 12 \cdot 2^{N_t} N_s^3 K^{N_t} (\cosh(\mu/T) \Omega_R + i \sinh(\mu/T) \Omega_I) + \dots \right)$$

- 有効ポテンシャル

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, \kappa) = -\ln[R(P, \kappa)W(P, \beta, 0)] = \underbrace{V_{\text{eff}}(P, \beta, 0)}_{\text{2-flavor クロスオーバー}} + \underbrace{-\ln[R(P, K)]}_{\text{?}} = \underbrace{\text{?}}_{\text{2+Nf-flavor 一次相転移}} \leftrightarrow \frac{dV_{\text{eff}}}{dP} \text{ (傾きがS字曲線)}$$

$$\ln R(P) = \ln \left\langle e^{6N_{\text{site}}(\beta-\beta_0)\hat{P}} \prod_f \frac{\det M(m_f, \mu_f)}{\det M(m_0, 0)} \right\rangle_{P:\text{fixed}} \approx \ln \left\langle \exp(6hN_s^3 \hat{\Omega}_R) \right\rangle_{P:\text{fixed}} + (P \text{ の 1 次項})$$

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad (\mu=0 \text{ 質量縮退の場合})$$

$\mu \neq 0$ での有効ポテンシャル

$$V_{\text{eff}}(P, \beta, h) = V_{\text{eff}}(P, \beta, 0) - \ln R(P, h)$$

$N_f=2$ p4-スタaggerド・クォーク作用,
 $m_\pi/m_\rho \approx 0.7$ [PRD71,054508(2005)]

- dV_{eff}/dP は h が大きくなるにつれて形を変える。
- $h \approx 0.06$ をこえるとS字型になる。

$\ln R$ の傾き

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad (\text{Wilson quarks の場合})$$

臨界点: $h_c = 0.0614(69)$

臨界点の N_f 依存性

$N_f=2$ p4-スタガード・クォーク作用 ($m\pi/m\rho\approx 0.7$) の結果: $h_c = 0.0614(69)$

- N_f が大きくなるにしたがって、臨界質量が大きくなる。

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \quad \rightarrow \quad \kappa_h^c = \frac{1}{2} \left(\frac{h_c}{2N_f} \right)^{1/N_t}$$

- N_f が大きいと κ の臨界点が小さくなるので、
  - ホッピングパラメータ展開の近似がよくなる。
  - 反対に、 N_f が小さいと近似がよくない。
- $N_t=4$ クエンチ・シミュレーションの場合、 $\kappa=0.18$ ぐらいで、ホッピングパラメータ展開の1項目と2項目が同じぐらいの大きさ。
  - $N_f=10, N_t=4$ で、 $h_c = 0.0614(69) \rightarrow \kappa_h^c \approx 0.118$
    - これぐらいの N_f ならおそらく適用可能

2+N_f-flavor QCDの有限密度での臨界点

Ejiri, Yamada, Phys. Rev. Lett. 110,172001 (2013)

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t}$$

Wilson quarks

$$h = N_f / (4(2m_h)^{N_t})$$

staggered quarks

質量: 小

h

- $O(\mu^6)$ のテイラー展開で $\det M$ を評価。
- 密度が上がると、一次相転移の領域が大きくなる。

Light quark mass dependence (preliminary)

- 単調増加関数から、S字型関数に変わる。
- 臨界点：軽いクォークの質量にほとんど依存しない。

軽いクォーク質量依存性 (preliminary)

$$h = 2N_f (2\kappa_h)^{N_t} \text{ for Wilson quarks}$$

π/ρ 質量比依存性

WI quark mass 依存性

- 臨界点: 我々の調べた範囲では軽いクォーク質量依存性が非常に小さい。赤線は軽いクォーク質量無限大極限の臨界点。
- 2-flavor QCD の質量ゼロ極限付近に一次相転移領域が現れる兆候は見られない。

まとめと今後の展望

- テクニカラー模型の構築を目指した軽いフェルミオンが2つある多フレーバーQCDの有限温度相転移が1次相転移かどうか調べた。
  - 電弱バリオジェネシスを実現するためには1次相転移が必要。
- 重いクォークの質量が増加すると、1次相転移がクロスオーバーに変わる。
  - 1次相転移の終点の質量はフレーバー数が増えるにしたがって大きくなる。
- その臨界質量は化学ポテンシャルを大きくしても大きくなる。
  - 2+1フレーバーQCDでこのような性質が確認できたら、有限密度で臨界点があるところの強い証拠になる。
  - N_f が大きいときは一次相転移の領域が広いので、計算が容易になる。 N_f によらないユニバーサルな性質、3重臨界点付近のスケーリング則など、を調べるための良い模型になる。
- 重いクォーク質量無限大極限を調べれば2フレーバーがわかる。
  - 質量ゼロ付近に1次相転移がある兆候は見られなかった。